


## 4.2 Accidente cerebro-vascular (CVA) y ataque isquémico transitorio (TIA)



(1) Signos y síntomas sugestivos de accidente cerebro-vascular: debilidad nueva de un lado del cuerpo comparado con el otro. Dificultad al hablar o "lengua pesada," cambios mentales o estado alterado de conciencia, sudoración, convulsiones. Pacientes que describen un déficit neurológico temporero pero que ya resolvió, deben ser transportados ante la sospecha de un ataque isquémico transitorio (TIA). TIA puede ser preámbulo a un CVA y amerita evaluación completa en un hospital.

(2) Factores de riesgo para enfermedad cardio-vascular: historial pasado de CVA, diabetes, hipertensión, fumador, historial familiar de CVA, arritmias cardíacas (fibrilación atrial).

(3) Hipertensión puede ser un reflejo protector del cerebro para mantener perfusión adecuada al área afectada por el CVA. Bajar la presión de forma abrupta puede empeorar a estos pacientes. Solo se administrará medicamento anti-hipertensivo en pacientes con presión mayor de 180/120 mm/Hg.

(4) Niveles elevados de azúcar en sangre pueden empeorar la condición de pacientes con CVA. Solo se administrará dextrosa hipertónica luego de confirmar hipoglucemia mediante Dxt.

(5) Normodyne está relativamente contraindicado en pacientes diabéticos y asmáticos.

**Revisado**  
**04/2011**