

# CERO MOSQUITO = CERO ZIKA

## Síntomas

Comienzan de 3 a 7 días luego de la picadura del mosquito infectado. Generalmente, duran entre cuatro y siete días y pueden confundirse con los del dengue.

- Fiebre
- Sarpullido
- Dolor en las articulaciones
- Inflamación que suele concentrarse en manos y pies
- Ojos rojos (conjuntivitis sin secreción)
- Dolor de cabeza
- Dolor detrás de los ojos
- Vómitos



Si presenta estos síntomas visite a su médico y **PROTÉJASE CON REPELENTE DE MOSQUITOS**. Evite transmitir la infección.

## Si usted tiene ZIKA

- 1 de cada 5 personas infectadas se enfermará o presentará síntomas.
- El periodo de incubación suele ser de entre 3 y 12 días. Tras este período, aparecen los síntomas.
- Los primeros 7 días de la enfermedad son clave
- Si no presenta síntomas, no sabrá que tiene ZIKA pero podría transmitirlo si lo pica el mosquito.
- Si presenta síntomas, igualmente podría transmitirlo a otra persona si lo pica el mosquito.



**La posible relación entre el ZIKA y la microcefalia** en recién nacidos de madres infectadas con ZIKA durante el embarazo **no ha sido constatada mediante estudios clínicos**.

Es hasta ahora una deducción epidemiológica debido a la relación entre el aumento de mujeres embarazadas con ZIKA y el alza en nacimientos de bebés con microcefalia.

Tampoco ha sido demostrado científicamente que el ZIKA genere la enfermedad autoinmune, síndrome Guillan-Barré, que evoluciona causando parálisis casi siempre transitorias en diferentes zonas del cuerpo.

Para más información visita: <http://www.salud.gov.pr/> o llama al 3-1-1

**ALIANZA NACIONAL PARA COMBATIR EL ZIKA.**

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones #CEE-SA-16-7434